

***Atlas rozšíření ohrožených
druhů květeny jižní části Čech***

2014

Mapy obsazenosti fytochorionů

K zobrazení rozšíření rostlin je použita mapa fytochorionů (fytochorion je termín sdružující fytogeografický okres a podokres) převzatá z Regionálně fytogeografického členění ČR (Skalický in Hejný & Slavík 1988). Pokud byl taxon alespoň jednou v daném fytochorionu zaznamenán, je tento fytochorion vybarven. Jsou rozlišeny tři kategorie: původní výskyt (), adventivní výskyt () a charakter výskytu neznámý (). Toto rozlišení nebylo provedeno u orchidejí a zástupců oddělení kapradiny (*Polypodiophyta*), u kterých je častý druhotný výskyt vzniklý díky snadnému šíření diaspor a možnosti uchycení na antropogenních stanovištích. Pouze u vybraných taxonů je znázorněno aktuální (od roku 2000) rozšíření () versus historický výskyt (). U fytogeografických okresů členěných na podokresy byly mapovány výskyty v jednotlivých podokresech. Pokud byl výskyt rostliny v literárním zdroji vztažen pouze obecně k celému fytogeografickému okresu, který se dále člení v podokresy, pak tento údaj není v mapě zobrazen. Fytochoriony Střední Povltaví a Táborsko-vlašimská pahorkatina, které zasahují do území jižní části Čech dvěma částmi, a Boubínsko-stožecká hornatina, který má dvě disjunktní části, jsou mapovány jako jeden celek, tj. k obsazení obou částí stačil výskyt v části jedné. Záznamy z různých důvodů pochybné či nejisté (determinační omyly a nejistoty) nejsou v mapách zobrazeny stejně jako údaje o výsadbách. Mapy nebyly vytvořeny pro taxony kategorie D1, pro vybrané taxony v kategorii D2 a pro několik rostlin s nejasným charakterem výskytu (např. *Polemonium caeruleum* a *Spiraea salicifolia*).

Atlas byl vytvořen pro potřeby členů a spolupracovníků Jihočeské pobočky České botanické společnosti. Mapy byly převzaty z Červené knihy květeny jižní části Čech (Lepší et al. 2013).

P. Lepší, M. Lepší, K. Boublík, M. Štech & V. Hans (eds)

Literatura

- Hejný S. & Slavík B. (eds) (1988): Květena České socialistické republiky 1. – Academia, Praha.
Lepší P., Lepší M., Boublík K., Štech M. & Hans V. (eds) (2013): Červená kniha květeny jižní části Čech. – Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 503 p.

Mezofytikum

- 35d. Březnické Podbrdsko
- 36. Horažďovická pahorkatina
- 36a. Blatensko
- 36b. Horažďovicko
- 37. Šumavsko-novohradské podhůří
- 37a. Horní Pootaví
- 37b. Sušicko-horažďovické vápence
- 37c. Nezdické vápence
- 37d. Čkyňské vápence

- 37e. Volyňské Předšumaví
- 37f. Strakonické vápence
- 37g. Libinské Předšumaví
- 37h. Prachatické Předšumaví
- 37i. Chvalšínské Předšumaví
- 37j. Blanský les
- 37k. Křemžské hadce
- 37l. Českokrumlovské Předšumaví
- 37m. Vyšebrodsko
- 37n. Kaplické mezihoří
- 37o. Kaňon Malše

- 37p. Novohradské podhůří
- 37q. Soběnovská vrchovina
- 38. Budějovická pánev
- 39. Třeboňská pánev
- 40. Jihočeská pahorkatina

- 40a. Písecko-hlubocký hřeben
- 40b. Purkarecký kaňon
- 40c. Lhotický perm
- 41. Střední Povltaví
- 42. Votická pahorkatina

- 42a. Sedčansko-milevská pahorkatina
- 42b. Tábořsko-vlašimská pahorkatina
- 43a. Čertovo břemeno
- 67. Českomoravská vrchovina
- 68. Moravské podhůří
- Vysočiny

Oreofytikum

- 88. Šumava
- 88a. Královský hvozd
- 88b. Šumavské pláně
- 88c. Javorník
- 88d. Boubínsko-stožecká hornatina
- 88e. Trojmezenská hornatina
- 88f. Želnavská hornatina
- 88g. Hornovltavská kotlina
- 88h. Svatotomáská hornatina
- 89. Novohradské hory
- 90. Jihlavské vrchy





